

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasında ki Süre
ELMA	Avrupa Kırmızı Örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>) İki Noktalı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Akdiken Akarı (<i>Tetranychus vinensis</i>)	20ml/100 lt su	28 gün
BAĞ	İki noktalı Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 lt su	56 gün
SEBZE	İki noktalı Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>), (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	30 ml/100 lt su	3 gün
ŞEFTALİ	İki noktalı Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml/100 lt su	21 gün
PAMUK	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>),	40 ml/ da	-
SOYA	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	40 ml/ da	-

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANILIŞI:

-İZOLTİTANİK SC'yi yılda yalnız bir kez kullanınız.

-Avrupa Kırmızı Örümceği'ne karşı, kışlık yumurtalar açılmadan önce,yani ağaçların pembe tomurcuk dönemi başlangıcında ilaçlama yapılmalıdır. Bu devre kaçırıldığı taktirde yaprak başına ortalama 1-2 ergin görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

-İki Noktalı Kırmızı Örümcek, Akdiken Akarı ve diğerlerinin hakim olduğu bahçelerde yapraklarda ilk hareket görülür görülmez, yani taç yaprakların dökülmesi ile meyve tutumu zamanı arasında ilaçlama yapılmalıdır.

-Bağ, sebze ve pamukta iki noktalı kırmızı örümcek yumurtalarına karşı ilk örümcek hareketi görüldüğünde(yaprak başına 1-2 ergin)ilaçlama yapılmalıdır.

-Önerilen dozda ilaç ölçülür ve ayrı bir kaptaki miktar su ile bulamaç haline getirilip iyice karıştırılır. Bu karışım ilaçlama aletinin yarıya kadar su ile doldurulmuş deposuna ilave edilir. Sonra karıştırılarak depo gerekli su miktarı ile tamamen doldurulur.

-İZOLTİTANİK SC ile ilaçlamadan en iyi sonucun alınabilmesi iyi bir kaplama ilaçlama ile mümkündür. Ağaçların her tarafı yıkanır gibi ilaçlanmalıdır.

-Etki şekil, benzer ilaçların üst üste kullanılmaları ilaçlara karşı direnci teşvik ettiğinden, muhtemel bir direnç olayını engellemek için benzer etki şekillerine sahip ilaçları ikinci defa kullanmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Birçok insektisit ve fungusit ile karıştırılıp kullanılabilir.

İZOLTİTANİK SC

AKARİSİT (Kırmızı Örümcek İlacı)

Süspansiyon Konsantre (SC)

Litrede 500gr. Saf Clofentezine içerir.
3.6 bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
Sıçanlara akut ağızdan LD₅₀ =3200 mg/kg

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK KAPALI VE KİLİTLİ OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ.
SİGARA İÇMEYİNİZ
İLAÇLANMIŞ İNSAN VE HAYVAN GİRMESİNDE SAKINCA YOKTUR.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Belirli bir semptomu yoktur, muhtemelen halsizlik görülür. Yüksek miktarlarda alındığı taktirde göz ve deride yanmalara sebebiyet verir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

İnsan ve hayvanlarda toksisitesi düşüktür, genel korunma tedbirlerine dikkat ediniz. Deriye bulaşması halinde en az 15 dakika temiz bol su ile yıkayınız. Zehirlenme halinde hastayı dinlendirin ve derhal doktor çağır, hastayı ilaçlı sudan uzaklaştır. İlaç etiketini ve ambalajını doktora götürünüz.

ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde belirtilere göre tedavi uygulayınız. Hastayı kusturmaya çalışmayınız. Ilık su ile mideyi yıkayınız.

UZEM(ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ)TEL:114



14 Nisan 2011

Dr. Ahmet AKSLAN
Genel Müdür Yardımcısı
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KURUM VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
NET MİKTARI (KG VEYA LT) :
BRÜT AĞIRLIĞI(KG) :
AZAMI PER. SATIŞ FİYATI(KDV'LI):
RUHSAT TARİHİ VE NO'SU :
T.B. YAZISININ TARİH VE NO'SU

(Handwritten signature)

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

İZOLTİTANİK SC her çeşit insektisit ve fungusit ile karıştırılıp atılabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLCEK HUSUSLAR:

-Bal arılarına ve balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına bulaştırmayın.

-İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.

-Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.

-Son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme sürelerine uyunuz.

-Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

Usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal(serin ve kuru) şartlar altında ve orijinal ambalajlarında saklandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerine hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. İlacı dondan koruyunuz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak ve önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulanma kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Metropol Kimya San. ve Tic.Ltd.Şti.

Işıklar Cad. Ahmet Muhip Dranas Sk.

No:21 Kat:6 D:11 34750

Küçükbakkalköy-Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0 216 573 83 38 – 573 02 36

Fax: 0 216 576 78 51

www.metropolkimya.com.tr

e-mail: info@metropolkimya.com.tr

İMALATÇI FİRMA:

Metropol Kimya San. ve Tic.Ltd.Şti.

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202.Cadde No:19

Polatlı / ANKARA

Tel: 0 312 6265087(3 Hat)

Fax: 0 312 6265086